

Памятка для пациента

Памятка для пациента содержит важную информацию по безопасности, которую Вы должны знать при применении препарата Терифлуномид. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата Терифлуномид для получения полной информации.

Пожалуйста, предъявите Памятку медицинскому работнику, участвующему в оказании Вам медицинской помощи.

Важные побочные эффекты (нежелательные реакции)

Терифлуномид является иммуномодулятором, то есть снижает активность иммунной системы. В ряде случаев терифлуномид может вызывать поражение печени (гепатит), а также снижать выработку форменных элементов крови: лейкоцитов, борющихся с инфекцией (нейтрофилов), и тромбоцитов, участвующих в свертывании крови.

До начала лечения необходимо проверить анализ крови и артериальное давление. Во время лечения терифлуномидом следует регулярно контролировать данные показатели.

Незамедлительно обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:

- Пожелтение кожи или белков глаз (желтуха), необъяснимая тошнота или рвота, боль в животе или более темная моча, чем обычно. Эти симптомы могут свидетельствовать о нарушении функции печени.
- Признаки инфекции, такие как высокая температура, кашель, увеличение лимфатических узлов, боль при мочеиспускании, заторможенность или нарушение сознания.

Информация для женщин детородного возраста

- Терифлуномид противопоказан для применения во время беременности. Также его применение противопоказано у женщин, планирующих беременность, так как препарат может вызвать серьезные врожденные дефекты развития. В период лечения терифлуномидом необходимо использование эффективных методов контрацепции.

- Не начинайте прием терифлуномида, если Вы беременны или думаете, что можете быть беременны. Необходимо выполнить тест на беременность до начала лечения Терифлунонимом.
- Во время и после лечения терифлунонимом необходимо использовать эффективные методы контрацепции до тех пор, пока уровень препарата в крови не станет низким. Обратитесь к врачу для подбора наиболее подходящего Вам метода контрацепции.
- Сообщите своему врачу, если Вы хотите изменить метод контрацепции или планируете забеременеть после прекращения лечения Терифлунонимом. Также необходимо сообщить врачу, если Вы планируете или кормите грудью.
- При подозрении на наступление беременности в период лечения Терифлунонимом или в течение двух лет после прекращения лечения, необходимо немедленно обратиться к врачу, а также выполнить тест на беременность. В случае, если беременность подтвердится, Вам может потребоваться применение ряда препаратов, ускоряющих выведение терифлуномида из организма для уменьшения риска развития пороков плода.

Вы можете сообщить о побочных эффектах (нежелательных реакциях), развившихся при применении лекарственного препарата Терифлунонимид производства АО «БИОКАД», любым удобным способом:

- по электронной почте: safety@biocad.ru
- по почте: 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, 34-А
- по факсу с пометкой «фармаконадзор»: 8-812-380-49-33 доб. 8639
- по телефону: 8-812-380-49-33
- заполнить онлайн форму на сайте: <https://biocad.ru/farmakonadzor>

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете собрать больше информации о безопасности препарата.

Имя пациента: _____

Дата назначения препарата Терифлунонимид: _____

Лечебное учреждение: _____

ФИО врача: _____

Контакты врача для экстренной связи: _____